

Iberogast®



Tinktura

Držitel registračního rozhodnutí

☒ STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5
D-64295 Darmstadt, Německo
Telefon: +49 6151 3305-0
Email: info@steigerwald.de

Složení

100 ml přípravku obsahuje:	
Iberidis amarae herbae recentis extractum fluidum	15,0 ml
Angelicae radices extractum fluidum	10,0 ml
Matricariae extractum fluidum	20,0 ml
Carvi extractum fluidum	10,0 ml
Cardui mariae extractum fluidum	10,0 ml
Melissae folii extractum fluidum	10,0 ml
Menthae piperitae folii extractum fluidum	5,0 ml
Chelidonii extractum fluidum	10,0 ml
Liquiritiae extractum fluidum	10,0 ml

Indikační skupina

Fytofarmakum, digestivum, spasmolytikum, anti-ulcerosum.

Charakteristika

Složený přípravek obsahující lihové výtažky z 9 druhů vegetabilních drog. Obsahové látky nadzemní části štěněníčku hořkého působí příznivě při onemocnění zažívací soustavy různého původu zapříčiněné poruchami stahů žaludku a střev. Přípravek reguluje napětí a hybnost střev. V závislosti na výchozím stavu nemoci působí zlepšení napětí nebo uvolňuje křeče svaloviny zažívacího ústrojí (tzv. duální efekt). Má i mírný protizánětlivý účinek.

Indikace

Poruchy funkce a hybnosti žaludku a střev, zánět

žaludku, křeče žaludku a střev, žaludeční a dvanáctníkové vředy.

Kontraindikace

Iberogast se neužívá při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku, v těhotenství a při kojení.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se porad'te s lékařem.

Interakce

Nejsou známy.

Dávkování

Dospělí 3 krát denně 20 kapek, děti od 6 let 3 krát denně 10 kapek vypít s malým množstvím tekutiny (nejlépe vlažné) před jídlem nebo při jídle.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chráňte před světlem.

Upozornění

Během skladování se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který neovlivňuje jakost a účinek přípravku. Před použitím protřepat.

Obsahuje 31% (obj.) lihu. Možnost zdravotního rizika u nemocných s těžkými poruchami jaterních funkcí, u epileptiků, alkoholiků a nemocných s poruchami mozkových funkcí.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

20 ml, 50 ml, 100 ml

Datum poslední revize

4.7.2000

Registrační číslo

94/475/96-C